

INFORMACINIS LAPELIS

Milprazon 4 mg/10 mg pl vele dengtos tablet s mažoms kat ms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems ka iukams

1. RINKODAROS TEIS S TUR TOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIM EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teis s tur tojas

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slov nija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidim

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slov nija
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Milprazon 4 mg/10 mg pl vele dengtos tablet s mažoms kat ms ir ne mažiau kaip 0,5 kg sveriantiems ka iukams

Milbemicino oksimas, prazikvantelis

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Kiekvienoje tablet je yra:

veikli j medžiag :

milbemicino oksimo 4 mg,
prazikvantelio 10 mg.

Rudai geltonos, ovalios, abipus išgaubtos pl vele dengtos tablet s su vagele vienoje pus je.
Tabletes galima padalyti lygias dalis.

4. INDIKACIJA (-OS)

Kat ms gydyti, esant mišriam užsikr timui toliau išvardytomis nesubrendusi ir suaugusi nematod ir cestod r šimis.

- Cestodai

Dipylidium caninum

Taenia spp.

Echinococcus multilocularis

- Nematodai

Ancylostoma tubaeforme

Toxocara cati

Širdies kirm li ligos (*Dirofilaria immitis*) profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo cestod .

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti jaunesnėms nei 6 savaitėms ir/ ar mažiau kaip 0,5 kg sveriančioms katėms.
Negalima naudoti, padidėjus jautrumui veikliosioms medžiagoms ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais, ypač jaunosms katėms, po milbemicino oksimo ir prazikvantelio derinio naudojimo pasireiškia sisteminiai požymiai (pvz., letargija), neurologiniai požymiai (pvz., raumenų drebulys ir ataksija / nekoordinuoti judesiai) ir (arba) virškinimo trakto sutrikimo požymiai (pvz., vėmimas, viduriavimas).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės (mažos katės ir kačiukai).

8. DOZAVIMAS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Sušerti.

Siekiant užtikrinti tinkamą vaisto dozę, gyvūnams būtina pasverti.

Mažiausia rekomenduojama dozė: 2 mg milbemicino oksimo ir 5 mg prazikvantelio 1 kg kūno svorio, sušerti per kartą.

Toliau pateikiamos praktinės dozavimo rekomendacijos, atsižvelgiant į katės kūno svorį.

Kūno svoris	Plėvele dengtos tabletės mažoms katėms ir kačiukams (rudai geltonos tabletės)
0,5–1 kg	½ tabletės
> 1–2 kg	1 tabletė

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Veterinarinį vaistą reikia duoti su pašaru arba gyvūnui šiek tiek pačius. Tokiu būdu užtikrinama optimali apsauga nuo širdies kirmėlių ligos.

Šis veterinarinis vaistas gali būti naudojamas širdies kirmėlių profilaktikai, jei tuo pat metu reikalingas gydymas nuo kaspinuočių. Šio veterinarinio vaisto naudojimo trukmė širdies kirmėlių profilaktikai yra 1 mėnuo. Reguliariai širdies kirmėlių profilaktikai geriau naudoti vienos veikliosios medžiagos vaistą.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.
Šiam veterinariniam vaistui specialiai laikymo temperatūros sąlygų nereikia.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę ir tabletes padalijus per pusę, – 3 mėn.
Per pusę padalytą tabletę laikyti žemesnėje kaip 25°C temperatūroje originalioje lizduotėje ir sunaudoti kito naudojimo metu.
Lizduotę laikyti kartoninėje dėžutėje.
Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant lizduotės ir kartoninės dėžutės po „Tinka iki“ ar „EXP“.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atskirą šį paskirties gyvūnams
Rekomenduojama vienu metu gydyti visus namų ūkyje esančius gyvūnus.

Siekiant efektyvios širdies kirminėlių kontrolės būtina atsižvelgti vietinę epidemiologinę informaciją (informaciją apie esančius parazitus ir jų jautrumą tam tikram kirminėlių gydymui) ir kaimo gyvenimo sąlygas.

Esant *D. caninum* infekcijai ir siekiant išvengti pakartotinio užsikrėtimo, tuo pačiu metu rekomenduotina gydyti nuo užsikrėtimo tarpiniais parazitais šeimininkais, tokiais kaip blusos ir utėlės.

Dažnai ir pakartotinai naudojant to paties klasės antihelminzines (kirminėlių naikinančias) medžiagas, parazitai gali tapti joms atsparūs.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Tyrimai su labai nusilpusiomis ar sunkiu inkstų ar kepenų nepakankamumu sergančiomis katėmis neatlikti. Tokiems gyvūnams šio vaisto naudoti nerekomenduotina arba naudoti galima tik atsakingam veterinariniam gydytojui vertinus naudos ir rizikos santykį.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams
Atsitiktinai prarijus tabletes (ypač vaikams), nedelsiant reikia kreiptis gydytojui ir parodyti šio veterinarinio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.
Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.
Echinokokozė yra pavojinga žmonėms. Kadangi echinokokozė yra liga, apie kurią reikia pranešti Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijai (OIE), iš atitinkamos kompetentingos institucijos reikia gauti tikslius nurodymus dėl gydymo, tolesnio stebėjimo ir asmeninių apsaugos priemonių.

Vaikingumas ir laktacija
Vaistą galima naudoti veisiamoms katėms, skaitant katingas ir laktuojančias kates.

Sveikatos veiksnių su kitais vaistais ir kitos sveikatos formos
Kartu naudojami milbemicino oksimas ir prazikvantelis su selamektinu toleruojami gerai.
Rekomenduotomis dozėmis naudojant makrocikliną lakton selamektiną kartu su milbemicino oksimu ir prazikvantelio deriniu, jokia sveikatos veiksnių nebuvo nustatyta. Kadangi kiti tyrimai neatlikti, šis vaistas naudoti kartu su kitais makrocikliniais laktonais reikia atsargiai. Be to, tokie tyrimai su veisiamais gyvūnais neatlikti.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina
Perdozavus vaisto, be simptomų atsirandančių vaisto vartojant rekomenduojamomis dozėmis (žr. 6 p.), papildomai gali atsirasti seilėtekis. Šis simptomas dažniausiai praeina savaime per vieną parą.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEK NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2015 m. balandžio mėn.

15. KITA INFORMACIJA

D žutis, kurioje yra 1 lizduotė su 2 tabletėmis.

D žutis, kurioje yra 1 lizduotė su 4 tabletėmis.

D žutis, kurioje yra 12 lizduotė po 4 tabletes.

Gali būti platinamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

UAB KRKA Lietuva
Senasis Ukmergės kelias 4,
Užubališkis, Vilniaus raj.,
LT-14013
Tel. +370 5 236 2740