

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DELTATIC 1,056 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Viename 60 cm (26,40 g) antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

deltametrino 1.056 g

pagalbinės medžiagos:

titano dioksido (E171) 0,396 g

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Vaistinis antkaklis

Baltas antkaklis

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys (0 – 25 kg), maži ir vidutinio dydžio šunys

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims, užsikrėtusiems deltametrinui jautriais parazitais, gydyti.

Prevencijai nuo pakartotinio užsikrėtimo erkėmis (*Ixodes ricinus* ir *Rhipicephalus sanguineus*) dėl 6 mėnesius trunkančio žudomojo poveikio.

Prevencijai nuo smėlinių blusų (*Phlebotomus perniciosus*) įkandimų dėl 5 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia joms maitintis).

Prevencijai nuo uodų (*Culex pipiens*) įkandimų dėl 6 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia jiems maitintis).

4.3. Kontraindikacijos

Nesant tyrimų duomenų, vaisto negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Kadangi antkaklio poveikis pilnai pasireiškia po 1 savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį likus 1 savaitei iki galimo gyvūno užsikrėtimo.

Erkės turėtų žūti ir nukristi nuo šuns per 24 – 48 val. po užsikrėtimo dar nespėjusios pasimaitinti, tačiau po gydymo gali pasitaikyti pavienių prisitvirtinusių erkių. Dėl šios priežasties negalima atmesti erkių pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo galimybes. Smėlinių blusų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo galimybė, esant nepalankioms sąlygoms, negali būti visiškai atmesta.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams
Plovimo šampūnu poveikis vaisto veiksmingumui nebuvo tirtas.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus šio vaisto gali pasireikšti šalutiniai poveikiai, įskaitant ir neurotoksinį poveikį.

Produktą laikyti originalioje pakuotėje. Iki naudojimo laikyti antkaklį paketėlyje.

Užsegant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Negalima leisti vaikams žaisti su antkakliu ar dėti jo į burną. Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti. Užsegus antkaklį, reikia šaltu vandeniu nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus į burną ar prarijus, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę gydytojui.

Vengti per ilgo sąlyčio su antkakliu ar šunimi, seginčiu antkaklį. Vengti šeiminkams, o ypač vaikams, miegoti kartu su šunimis, seginčiais antkaklius.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidinto jautrumo (alergines) reakcijas. Žmonės, kuriems yra nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu ir juo gydomu gyvūnu. Pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos.

Kitos atsargumo priemonės

Nors atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina antkaklio veiksmingumo, tačiau deltametrinas yra toksiškas žuvims bei kitiems vandens organizmams. Šunų, seginčių šiuos antkaklius, negalima leisti maudyti vandens telkiniuose.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retais atvejais pastebėtos vietinės odos reakcijos (niežulys, paraudimas, plaukų slinkimas) kaklo srityje arba ant visos odos, o tai gali reikšti vietinę arba bendrą padidinto jautrumo reakciją.

Taip pat, labai retais atvejais pastebėti elgesio pakitimai (pvz., letargija arba hiperaktyvumas) dažnai siejami su odos sudirginimu.

Labai retais atvejais pastebėti skrandžio ir žarnyno sutrikimai, tokie kaip vėmimas, viduriavimas ir padidėjęs seilėtekis.

Labai retais atvejais pastebėti nervų ir raumenų sutrikimai, tokie kaip ataksija ir raumenų drebulys. Nusegus antkaklį, simptomai paprastai išnyksta per 48 val.

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti. Turėtų būti taikomas simptomis gydymas, nes specifinis priešnuodis nėra žinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).>

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimai su žiurkėmis ir triušiais teratogeninis poveikis nepatvirtintas. Šio veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Nerekomenduojama naudoti vaikingumo metu. Galima naudoti laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti kartu su kitomis ektoparazitocidinėmis medžiagomis (piretroidais arba organofosfatais).

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Vienas antkaklis skirtas vienam šuniui. 60 cm ilgio antkaklį naudoti mažiems ir vidutinio dydžio šunims. Antkaklis tinka iki 48 cm apimties augintinio kaklui.

Antkaklį reikia išimti iš pakuotės ir nuplėšti apsauginę juostelę. Antkaklį užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą antkaklio dalį, jei ši ilgesnė nei 5 cm.



Šis antkaklis turi saugaus užsegimo mechanizmą, apsaugantį nuo pasismaugimo. Mažai tikėtinu šuns užsiveržimo antkakliu atveju, antkakliui praplatinti ir greitai išsilaisvinti pakanka paties gyvūno jėgos.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Šuniui atsitiktinai prarijus antkaklį, kreipkitės į veterinarijos gydytoją. Gali būti pastebėti šie apsinuodijimo simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, padidėjęs seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų stingimas. Šie simptomai paprastai praeina per 48 val. Šuniui atsitiktinai prarijus antkaklį, gyvūno šeimininkas turėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją ir neturėtų pats pradėti simptominio gydymo, tai turėtų įvertinti veterinarijos gydytojas.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos, insekticidai ir repelentai, piretriniai ir piretroidai.

ATCvet kodas: QP53AC11.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Deltametrinas, sintetinių piretroidų šeimai priklausanti molekulė, pasižymi akaricidiniu ir insekticidiniu poveikiu. Veikimo mechanizmas pagrįstas natrio kanalų pralaidumo pakeitimu, molekulė sukelia intensyvų sužadinimą, o po to seka paralyžius (šoko efektas), drebulys ir parazito žūtis.

Deltametrinas veikia atbaidančiai prieš kraujasiurbius, pernešančius *Leishmania infantum* (pirmuonis, leishmaniozės sukėlėjas).

5.2. Farmakokinetinės savybės

Deltametrinas nepertraukiamai išsiskiria iš antkaklio į kailį ir į odą dengiančią riebalų plėvelę. Veiklioji medžiaga iš tiesioginio kontakto vietos per lipidus pasiskirsto po visą odos paviršių ir patenka į plaukus.

Deltametrino absorbcija per odą yra nedidelė.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Polivinilchloridas,
kalcio stearatas,
sojos pupelių epoksiduotas aliejus,
diizooktiladipatas,
titano dioksidas (E171),
trifenilfosfatas,
kalcio ir cinko stearatai.

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nėra

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 30 mėnesių.
Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius pirminę pakuotę, – sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Paketėlius laikyti (kartoninėje) dėžutėje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Kiekvienas antkaklis yra supakuotas orui nepralaidžiamame paketėlyje, pagamintame iš polietileno tereftalato aliuminio polipropileno.

Pakuočių dydžiai:

Kartoninė arba metalinė dėžutė, kurioje yra 1 paketėlis su vienu 60 cm ilgio antkakliu.

Kartoninė arba metalinė dėžutė su 2 paketėliais, kuriuose yra po vieną 60 cm ilgio antkaklį.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

DELTATIC 1,056 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

7. REGISTRUOTOJAS

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 - Barselona
Ispanija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/19/2520/001-002

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2019-02-26

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2019-02-22

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS
KARTONINĖ / METALINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DELTATIC 1,056 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims
Deltametrinas

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Viename 60 cm (26,40 g) antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

deltametrino 1,056 g

3. VAISTO FORMA

Vaistinis antkaklis

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 x 60 cm

2 x 60 cm

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6. INDIKACIJA (-OS)

Šunims, užsikrėtusiems deltametrinui jautriais parazitais, gydyti

Prevencijai nuo pakartotinio užsikrėtimo erkėmis (*Ixodes ricinus* ir *Rhipicephalus sanguineus*) dėl 6 mėnesius trunkančio žudomojo poveikio.

Prevencijai nuo smėlinių blusų (*Phlebotomus perniciosus*) įkandimų dėl 5 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia joms maitintis).

Prevencijai nuo uodų (*Culex pipiens*) įkandimų dėl 6 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia jiems maitintis).

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tinka iki 48 cm apimties šuns kaklui.

Apsauga nuo pasismaugimo

8. IŠLAUKA

Netaikytina.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.
Iki naudojimo laikyti antkaklį originalioje pakuotėje vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleisti, šunų seginčių antkaklius, miegoti kartu su šeimnininkais, ypač vaikais.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}
Atidarius sunaudoti nedelsiant.

11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti paketėlius kartoninėje dėžutėje.

**12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.
Les Corts, 23
08028 - Barselona
Ispanija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/19/2520/001
LT/2/19/2520/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serijs

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

PAKETĖLIS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DELTATIC 1,056 g
Deltametrinas



2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

VETPHARMA
CHEMO

3. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Serija {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariam naudojimui.

B. INFORMACINIS LAPELIS

INFORMACINIS LAPELIS

DELTATIC 1,056 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

Les Corts, 23

08028 - Barcelona

Ispanija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

AB7 SANTE

Chemin des Monges

31450 Deyme

Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

DELTATIC 1,056 g, vaistinis antkaklis mažiems ir vidutinio dydžio šunims

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

Viename 60 cm (26,40 g) antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

deltametrino 1,056 g

pagalbinės medžiagos:

titano dioksido (E171) 0,396 g

Baltas antkaklis

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims, užsikrėtusiems deltametrinui jautriais parazitais, gydyti.

Prevencijai nuo pakartotinio užsikrėtimo erkėmis (*Ixodes ricinus* ir *Rhipicephalus sanguineus*) dėl 6 mėnesius trunkančio žudomojo poveikio.

Prevencijai nuo smėlinių blusų (*Phlebotomus perniciosus*) įkandimų dėl 5 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia joms maitintis).

Prevencijai nuo uodų (*Culex pipiens*) įkandimų dėl 6 mėnesius trunkančio atbaidomojo poveikio (neleidžia jiems maitintis).

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant tyrimų duomenų, vaisto negalima naudoti jaunesniems kaip 7 sav. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms.

Negalima naudoti šunims, turintiems odos pažeidimų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais pastebėtos vietinės odos reakcijos (niežulys, paraudimas, plaukų slinkimas) kaklo srityje arba ant visos odos, o tai gali reikšti vietinę arba bendrą padidinto jautrumo reakciją.

Taip pat, labai retais atvejais pastebėti elgesio pakitimai (pvz., letargija arba hiperaktyvumas) dažnai siejami su odos sudirginimu.

Labai retais atvejais pastebėti skrandžio ir žarnyno sutrikimai, tokie kaip vėmimas, viduriavimas ir padidėjęs seilėtekis.

Labai retais atvejais pastebėti nervų ir raumenų sutrikimai, tokie kaip ataksija ir raumenų drebulys. Nusegus antkaklį, simptomai paprastai išnyksta per 48 val.

Pasireiškus bent vienam iš minėtų simptomų, antkaklį reikia nusegti. Turėtų būti taikomas simptominis gydymas, nes specifinis priešnuodis nėra žinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).>

Pastebėjus bet kokią šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)


Šunys (0 – 25 kg), maži ir vidutinio dydžio šunys

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Vienas antkaklis skirtas vienam šuniui. 60 cm ilgio antkaklį naudoti mažiems ir vidutinio dydžio šunims. Antkaklis tinka iki 48 cm apimties augintinio kaklui.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Antkaklį reikia išimti iš pakuotės ir nuplėšti apsauginę juostelę. Antkaklį užsegti gyvūnui ant kaklo taip, kad nebūtų per laisvas ir kad neveržtų: tarp antkaklio ir kaklo turi likti dviejų pirštų pločio tarpas. Reikia nukirpti nereikalingą antkaklio dalį, jei ši ilgesnė nei 5 cm.



Šis antkaklis turi saugaus užsegimo mechanizmą, apsaugantį nuo pasismaugimo. Mažai tikėtinu šuns užsiveržimo antkakliu atveju, antkakliui praplatinti ir greitai išsilaisvinti pakanka paties gyvūno jėgos.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Paketėlius laikyti (kartoninėje) dėžutėje.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant etiketės, kartoninės dėžutės po < Tinka iki >. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams:

Kadangi antkaklio poveikis pilnai pasireiškia po 1 savaitės, rekomenduojama užsegti antkaklį likus 1 savaitei iki galimo gyvūno užsikrėtimo.

Erkės turėtų žūti ir nukristi nuo šuns per 24 – 48 val. po užsikrėtimo dar nespėjusios pasimaitinti, tačiau po gydymo gali pasitaikyti pavienių prisitvirtinusių erkių. Dėl šios priežasties negalima atmesti erkių pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo galimybės. Smėlinių blusų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo galimybė, esant nepalankioms sąlygoms, negali būti visiškai atmesta.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Plovimo šampūnu poveikis vaisto veiksmingumui nebuvo tirtas.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai prarijus šio vaisto gali pasireikšti šalutiniai poveikiai, įskaitant ir neurotoksinį poveikį.

Produktą laikyti originalioje pakuotėje. Iki naudojimo laikyti antkaklį paketėlyje.

Užsegant antkaklį negalima rūkyti, valgyti ar gerti. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

Negalima leisti vaikams žaisti su antkakliu ar dėti jo į burną. Antkaklio likučius ar nukirptus galiukus reikia nedelsiant išmesti. Užsegus antkaklį, reikia šaltu vandeniu nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus į burną ar prarijus, reikia kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti šio vaisto informacinę lapelį ar etiketę gydytojui.

Vengti per ilgo sąlyčio su antkakliu ar šunimi, seginčiu antkaklį. Vengti šeiminkams, o ypač vaikams, miegoti kartu su šunimis, seginčiais antkaklius.

Jautriems žmonėms deltametrinas gali sukelti padidinto jautrumo (alerginės) reakcijas. Žmonės, kuriems yra nustatytas padidintas jautrumas deltametrinui, turėtų vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu ir juo gydomu gyvūnu. Pasireiškus padidėjusio jautrumo reakcijoms, kreiptis medicininės pagalbos.

Kitos atsargumo priemonės

Nors atsitiktinis sąlytis su vandeniu nesumažina antkaklio veiksmingumo, tačiau deltametrinas yra toksiškas žuvims bei kitiems vandens organizmams. Šunų, seginčių šiuos antkaklius, negalima leisti maudyti vandens telkiniuose.

Vaikingumas ir laktacija

Laboratoriniais tyrimais su žiurkėmis ir triušiais teratogeninis poveikis nepatvirtintas. Šio veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo metu nenustatytas. Nerekomenduojama naudoti vaikingumo metu. Galima naudoti laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenaudoti kartu su kitomis ektoparazitocidinėmis medžiagomis (piretroidais arba organofosfatais).

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Šuniui atsitiktinai prarijus antkaklį, kreipkitės į veterinarijos gydytoją. Gali būti pastebėti šie apsinuodijimo simptomai: nekoordinuoti judesiai, drebulys, padidėjęs seilėtekis, vėmimas, užpakalinių kojų stingimas. Šie simptomai paprastai praeina per 48 val. Šuniui atsitiktinai prarijus antkaklį, gyvūno šeiminkas turėtų kreiptis į veterinarijos gydytoją ir neturėtų pats pradėti simptominio gydymo, tai turėtų įvertinti veterinarijos gydytojas.

Nesuderinamumai

Nėra

**13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti apsaugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2019-02-22

15. KITA INFORMACIJA

Pakuočių dydžiai:

Kartoninė arba metalinė dėžutė, kurioje yra 1 paketėlis su vienu 60 cm ilgio antkakliu.

Kartoninė arba metalinė dėžutė su 2 paketėliais, kuriuose yra po vieną 60 cm ilgio antkaklį.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.